

بیماری کوه گرفتگی

: Brisket disease / High mountain disease

این عارضه هنگامی رخ می‌دهد که بنا بر هر دلیلی فشار خون سرخرگ ریوی افزایش پیدا بکند و خون به داخل بطن راست پس زده شود که در نتیجه آن قلب راست بزرگ می‌شود و در نهایت علائم CHF در دام بروز می‌نماید. علت اصلی این بیماری هیپوکسی است که در ارتفاعات اتفاق می‌افتد و منجر به هیپرتروفی عضلانی ناحیه Tunica Media در سرخرگ ریوی می‌شود.

تغذیه با گیاهان خانواده Locoweed (از گروه یونجه) به علت داشتن سلنیوم زیاد و سمیت آن حیوان را مستعد به بروز این عارضه می‌کند. پنومونی‌های مزمن و بیماری‌های انگلی ریوی نیز می‌تواند باعث ایجاد این بیماری شود.

علائم بالینی:

علائم اولیه شامل ادم در ناحیه بریسکت (قبقب) — ناحیه ونترال حفره صدري و ادم دست و پا است. نبض ورید و داج و اتساع آن ممکن است وجود داشته باشد. دیسپنه و تاکی پنه اغلب وجود دارد. این دامها دچار تاکی کاردی می‌باشند که به علت نارسایی دریچه سه لتی، ممکن است صدای مرمز نیز شنیده شود. این بیماری بیشتر در گاو است و در اغلب موارد گوساله‌ها را نیز درگیر می‌کند.

درمان:

عبارت است از خارج کردن دام از ارتفاعات و درمان عوامل بوجود آورنده این عارضه مانند برونکوپنومونی و یا بیماری‌های انگلی ریوی و عوامل تغذیه‌ای.