

## پریکاردیت Pericarditis :

پریکاردیت به علت التهاب پریکاردیوم و تجمع مایع یا اگزودا در بین دو لایه ویسرال و پرییتال پری کارد ایجاد می‌شود.

### عوامل ایجادکننده پریکاردیت:

این عوامل عبارتند از نفوذ جسم خارجی به پری کارد (از داخل یا خارج)، سپتی سمی‌ها، ورود عفونت از ریه‌ها و یا پرده جنب به پریکارد، نئوپلازی در پری کارد و عفونتهای ویروسی.

### علائم بالینی:

این علائم عبارتند از تب، بی اشتهایی، دپریشن، کاهش وزن، اتساع ورید وداج، تاکی کاردی، ادم و دیس پنه.

درگاوان مبتلا تست ناله مثبت است که عبارت است از وارد کردن فشار توسط یک میله در ناحیه جناغ به طرف بالا و رها نمودن یکمرتبه آن.

در ابتدای پریکاردیت به علت تورم لایه ویسرال و پرییتال و لغزش این دو لایه روی هم صدای **Friction** در ناحیه قلب شنیده می‌شود که با ادامه بیماری و تجمع مایعات التهابی و گاز در بین این دو لایه، صدای **Splashing** شنیده می‌شود.

با ادامه بیماری، صداهاى قلبی شنیده نمی‌شود که به علت تجمع مایعات در اطراف قلب است.

مخاطات نیز ممکن است پرخون و سیانوزه باشند.

در نوار الکتروکاردیوگرام ارتفاع موج QRS کاهش پیدا کرده و شکل موج P نیز تغییر کرده است.

دو نوع پریکاردیت وجود دارد:

### **1- Effusive P :**

در این فرم، مایعات التهابی دور قلب جمع شده اند که با خارج کردن این مایعات از حفره پریکارد تا حدودی درد حیوان کم می شود. همچنین صدای Splashing شنیده می شود که بعد از پیشرفت از بین می رود.

### **2- Constrictive (Adhesive) P :**

در این فرم، لایه های اپی کارد به هم چسبیده اند در نتیجه بر خلاف فرم اول خارج کردن مایعات التهابی به راحتی انجام نمی شود و بی فایده است. در این فرم فقط صدای Friction وجود دارد که باعث اشتباه شدن آن با آندوکاردیت می شود.

### **درمان:**

به طور کلی پیش بینی بیماری خوب نیست مخصوصا اگر علائم CHF در دام ظاهر شود و بهترین توصیه، حذف دام می باشد.