

اگزما و درماتیت: Eczema – Dermatitis

اگزما عبارت است از واکنش سلولهای اپیدرم در مقابل موادی که نسبت به آن حساس هستند.

مواد آلرژن به صورت خارجی اثر میکنند که عمدتاً روی پوست است و یا به صورت داخلی و از طریق خون دام را مبتلا میکنند.

از مواد آلرژن خارجی میتوان به انگلها و برخی از مواد ضد فولیکولی و از مواد آلرژن داخلی میتوان به انگلهای داخلی و یا آمینهای تولید شده در روده اشاره نمود.

کثیف بودن سطح پوست بدن و تعریق مداوم از جمله عوامل مستعد کننده دام به اگزما است.

در ابتدا محل قرمز رنگ میشود و بعد از آن خیز داخل سلولی و بین سلولی بوجود میآید که جراحات ویژه اگزما تحت عنوان **Spongiosis** به وجود میآید.

در مرحله ابتدای اگزما، طاولهای کوچکی ایجاد میشود، بعد از آن پاره میشوند و باعث نشت سروما روی پوست میشود و دلمه تولید میگردد.

برخی موارد بدون اینکه طاولی ایجاد شود سروما از ناحیه درگیر خارج میشود که این مورد منجر به التهاب مزمن در پوست میشود که در نهایت باعث پاراکراتوز و یا تاکی درمی در ناحیه میشود. به طور کلی بروز اگزما در دامهای بزرگ نادر است.

درماتیت عبارت است از تورم اپی درم و درم که در اثر حساسیت به نور، سوختگی، تماس پوست با مواد شیمیایی بروز می کند و بسته به نوع عامل آن، این

بیماری به 5 فرم **حاد** - **مزمن** - **اولسراتیو** - **ترشجی** و **قانقاریایی** تقسیم می‌شود.

در تمامی حالات پوست ناحیه مبتلا ضخیم می‌شود و درد و خارش نیز وجود دارد و در نواحی سفیدرنگ بدن، قرمزی پوست مشخص است.

تشخیص تفریقی:

به طور کلی تشخیص اگزما از درماتیت بسیار مشکل است. در اگزما سیر بیماری مرتب و منظم است.

درمان:

می بایست عامل اولیه تحت درمان قرار گیرد و بستر حیوان تغییر کند و در فرمهای حاد از داروهای مسکن و ضد خارش و کورتونها و آنتی هیستامینها و داروهای ضد قارچی استفاده شود.