

## زرد زخم : Impetigo

زرد زخم عبارت است از یکسری طاوولهای کوچک با دیواره نازک که اطراف آن را منطقه قرمز رنگی احاطه می‌کند.

امکان دارد که داخل آن چرکی باشد و بعد ممکن است که این طاوولها بترکند و دلمه ای روی آنها را بپوشاند. عامل این عارضه در دامها معمولا **استافیلوکوکها** می‌باشند.

این باکتریها از طریق خراشهای پوستی وارد شده و ایجاد طاول می‌کنند که اگر پاره شوند باعث بروز جراحات دیگری در محل‌های مجاور می‌شوند و به راحتی از دامی به دام دیگر منتقل می‌گردند.

این عارضه بیشتر در نواحی کم موی بدن مثل پستانها اتفاق می‌افتد و جراحات ایجاد شده، معمولا به اندازه 3-6 میلی متر هستند که هیچ تمایلی به ادغام شدن ندارند.

در این عارضه خارش و تحریک وجود ندارد و در ابتدای بروز بیماری یک هاله قرمز رنگ در اطراف طاول وجود دارد.

طاوولها به زودی پاره می‌شوند و آنهایی که پاره نمی‌شوند چرکی شده و سپس پاره می‌شوند که در این حالت دلمه زرد رنگی روی آنها را می‌پوشاند.

آلودگی فولیکولهای مو معمولا وجود دارد و باعث ایجاد جوش و جراحات عمیق و وسیع تری در پوست می‌شود. معمولا در عرض یک هفته این عوارض بهبود می‌یابند ولی گاهی در اثر ایجاد جراحات جدید چندین هفته بهبودی طول می‌کشد.

این عارضه را می‌بایست با آبله گاوی که نوک پستانها را درگیر میکند و همچنین آبله کاذب گاوی تفریق داد.

در آبله گاوی کاذب (که به راحتی به انسان منتقل میشود)، جراحات ایجاد شده کوچکتر است و تمایل شدیدی به ادغام شدن دارند و در ناحیه درگیر تحریک شدید وجود دارد.

### درمان:

استراتژی درمان در دامها عمدتاً به صورت موضعی است و هدف اصلی جلوگیری از انتشار بیشتر جراحات می‌باشد. معمولاً نواحی درگیر را با محلولهای ضد میکروبی دوبار در روز شستشو می‌دهند. همچنین میتوان در کنار درمانهای موضعی از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف به صورت تزریقی نیز استفاده کرد.