

## انسداد مری: (Choke)

به علت عادات خاص غذایی، این عارضه بیشتر در گاوان دیده می‌شود.

اگر انسداد کامل باشد، به علت عدم خروج گازهای حاصل از تخمیر در شکمبه و نگاری، دام می‌میرد. انسدادهای نسبی باعث اختلال در بلع و بی‌اشتهایی می‌شوند.

انسداد ممکن است در اثر اجسام خارجی یا قطعات بزرگ مواد غذایی جامد مانند سیب، سیب زمینی، چغندر یا چوب ذرت (بلال) اتفاق بیافتد.

انسداد مری را باید از بیماری‌هایی که سبب اختلال بلع به علت ضایعات حلق و اختلال عملکرد عصبی - عضلانی می‌گردند، تفریق داد. همچنین ضایعات مادرزادی یا اکتسابی مری مانند آنومالی‌های کمان آئورت و دیورتیکولوم ممکن است علائم مشابه انسداد مری را ایجاد نمایند.

### علائم:

علائم اولیه عبارت است از اضطراب و افزایش ترشح بزاق که از دهان سرازیر می‌شوند و عدم توانایی در بلع.

این دامها ممکن است سرش را دیوانه‌وار به هر طرف تکان دهند و تلوتلو بخورند. در نهایت به علت عدم خروج آروغ و تجمع آنها در شکمبه، نفخ ایجاد می‌شود.

### پیشگیری:

میوه‌ها و ریشه‌ها را به صورت قطعات کوچک در دسترس دام قرار داده شود.

### **درمان:**

اولین اقدام برطرف کردن نفخ است. اگر دام دچار ناراحتی تنفسی نباشد، می‌توان به داخل معده (شکمبه) لوله معدی وارد کرد. استفاده از تروکار شکمبه یا جاگذاری فیستول موقت ممکن است لازم باشد.

مرحله دوم خارج کردن عامل مسدود کننده می‌باشد. گاهی بوسیله تزریق داخل وریدی مواد استفراغ آور، این انسداد برطرف می‌شود.

گاهی می‌توان ماده موجود در حلق را با دست بیرون کشید ولی باید از وارد کردن فشار بر روی عامل انسداد به طرف شکمبه به علت خطر پارگی مری، جلوگیری کرد.